



Schils
YOUNG ANIMAL NUTRITION

Feeding schedule(s)

PRODUCT: AS-Vital

Wann	Im Falle von oder vorbeugend gegen Darmstörungen oder Durchfall.	
Wie	In Vollmilch, Milchaustauscher oder Wasser mischen.	
Zeitraum	Für 1 bis 7 Tage.	
Anwendungsmethoden	Lage 1: vorbeugend	
	Tag 1	Bei geringerer oder langsamerer Aufnahme können bald Darmprobleme auftreten → vorbeugend 35-40 gr Produkt in normaler Milchsosis → Zweimal täglich
	Tag 2	Problemen bleiben 35-40 gr Produkt in normaler Milchsosis, zweimal täglich
	Tag 3	Bessere Futteraufnahme und mehr Appetit 35-40 gr Produkt in normaler Milchsosis, zweimal täglich
	Tag 4	Erhöhung der Futteraufnahme 25 g Produkt in normaler Milchsosis, zweimal täglich
	Tag 5	Normale Futteraufnahme 25 g Produkt in normaler Milchsosis, zweimal täglich
	Tag 6	Normale Futteraufnahme Normaler Fütterungsplan
	Tag 7	Normale Futteraufnahme Normaler Fütterungsplan
	Lage 2: vorbeugend bis aktiv	
	Tag 1	Bei geringerer oder langsamerer Aufnahme können bald Darmprobleme auftreten → vorbeugend 35-40 gr Produkt in normaler Milchsosis → Zweimal täglich
	Tag 2	Deutliche Anzeichen von Durchfall 50 gr Produkt in normaler Milchsosis, zweimal täglich
	Tag 3	Reduzierte Anzeichen von Durchfall, etwas mehr Appetit 50 gr Produkt in normaler Milchsosis, zweimal täglich
	Tag 4	Bessere Futteraufnahme, keine deutlichen Anzeichen von Durchfall 50 gr Produkt in normaler Milchsosis, zweimal täglich
	Tag 5	Abhängig vom Zustand des Kalbes (füttern Sie den normalen Fütterungsplan ohne Produkt, wenn es in gutem Zustand ist) 25 g Produkt in normaler Milchsosis, zweimal täglich
	Tag 6	Abhängig vom Zustand des Kalbes 25 g Produkt in normaler

		(füttern Sie den normalen Fütterungsplan ohne Produkt, wenn es in gutem Zustand ist)	Milchdosis, zweimal täglich
	Tag 7	Abhängig vom Zustand des Kalbes (füttern Sie den normalen Fütterungsplan ohne Produkt, wenn es in gutem Zustand ist)	25 g Produkt in normaler Milchdosis, zweimal täglich
	Lage 3: aktiv		
	Tag 1	Deutliche Anzeichen von Durchfall, kein Appetit	50 gr Produkt pro liter Wasser, zweimal täglich
	Tag 2	Verbleibende Anzeichen von Durchfall, kaum Appetit	50 gr Produkt pro liter Wasser, zweimal täglich
	Tag 3	Leichte Verbesserung des Kälberzustands	50 gr Produkt pro liter Wasser, zweimal täglich
	Tag 4	Weniger oder keine Anzeichen von Durchfall, mehr Appetit	25 g Produkt in normaler Milchdosis, zweimal täglich
	Tag 5	Keine Anzeichen von Durchfall und erholtem Appetit	25 g Produkt in normaler Milchdosis, zweimal täglich
	Tag 6	Normale Futteraufnahme	25 g Produkt in normaler Milchdosis, zweimal täglich
	Tag 7	Normale Futteraufnahme	25 g Produkt in normaler Milchdosis, zweimal täglich