Gebrauchsanleitung

FORTILIQ-C wird, zumindest während des Herbstes und des Winters, der Futterration, als Lösung in das Trinkwasser oder in die Tränke für die Jungtiere, beigemischt.
Ausgewachsenes Rind : 10ml/Tag/Tier für 4 Tage und anschließend 1-mal die Woche
Junges Rind : 5ml/Tag/ Tier für 4 Tage und anschließend 1-mal die Woche
Ziege - Schaf: 2ml/Tag/Tier für 4 Tage und anschließend 1-mal die Woche
Weibliches Ziegenlamm/Lamm: 1ml/Tag/Tier für 4 Tage und anschließend 1-mal die Woche
Geeigneter Nutzungszeitraum: eine regelmäßige Zufuhr während der risikobergenden kalten und feuchten Jahreszeiten

Zusammensetzung

Wasser, Ethylalkohol, Vitamine, Emulgatoren, Pflanzenextrakten

Analytische Bestandteile

Feuchtigkeit	87%
Rohprotein	0%
Roh-Cellulose	0,1%
Rohfett	2,2%
Rohasche	0,01%
Natrium	0,01%

Zusatzstoffe

Vitamine
3a700 Vitamin E

Racemisches α-Tocopherylacetat	10 000 IE/Liter
Vitamin C	20 000mg/Liter

Emulgatoren

Aromastoffe

Mischung aus aromatischen Substanzen

Aufmachung des Produktes

5-Liter Kanister
MHD 18 Monate

www.surlestoits.fr 10/15

nutrilac

Rue de la laiterie • 62180 VERTON • Tél. 03 21 84 34 34
Fax : 03 21 84 09 09 • contact@nutrilac.fr • www.nutrilac.fr